

Gonavet Veyx[®] injekció A.U.V.



- Ovuláció indukálása
- Ovuláció szinkronizálása meghatározott idejű inszeminációhoz
- Reprodukciós teljesítmény optimalizálásához



Gonavet Veyx injekció A.U.V.



1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME.

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, D-34639 Schwarzenborn, Németország

2.AZ ÁLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Gonavet Veyx injekció A.U.V.

3.HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1ml készítmény tartalmaz:

Hatóanyagok:

D-Phe6-Gonadorelin 0,050mg

Segédanyagok:

Klórkrezol 1,00mg

4.JAVALLAT(OK)

A reprodukciós funkciók kontrollja és stimulációja, a fogamzási arány optimalizálása szarvasmarha, sertés és ló esetén. Petefészek eredetű szaporodásbiológiai zavarok és a nemi szervek rendellenességeinek terápiájára szarvasmarha és ló esetén.

Szarvasmarha: Ovuláció indukálása LH-hiány okozta ovulációkésés esetén. Ovuláció szinkronizálása az ivarzás-szinkronizációt követően. A petefészek stimulációja a puerperium alatt az ellés utáni 12. naptól. LH hiány miatti petefészek ciszta kezelésére. Sertés: Ovuláció szinkronizálása meghatározott idejű inszeminációhoz a csoportos

állattenyésztés kereteiben belül, a vemhesülési aránya, valamint a reprodukciós teljesítmény optimalizálásához.

Ló: Az ivari ciklus központi eredetű rendellenességei, anösztrusz, aciklusos ösztrusz esetén, illetve ovuláció indukálása céljából a sárlás megrövidítése érdekében.

5. ELLENJAVALLATOK

Vemhesség.

Nem ajánlott tehenekben az ellést követő 12. hónaptól ovulációérett harmadlagos tüszők esetén, és lovaknak a sárlás megrövidítésére fertőzés vagy egyéb általános rossz egészségügyi állapotban.

6. MELLÉKATÁSOK

Nem ismeretesek.

7. CÉLÁLLATFAJOK

Szarvasmarha, sertés, ló.

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Sertés: 0,5-1,5 ml Gonavet Veyx injekció intramuszkulárisan vagy szubkután

Kocák: 0,5-1,0 ml, emsék: 1,0-1,5ml

Szarvasmarha: 1,0-2,0ml Gonavet Veyx injekció intramuszkulárisan

Ló: 2,0ml intramuszkulárisan

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

10. ÉLELMEZÉSI – EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha, ló, sertés

Nulla nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A készítményt gyerekek elől gondosan el kell zárni!

25C alatt, fénytől védve tartandó.

Lejáratási idő: 2 év

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 28 nap.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: nincs.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések: nincs.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

A hormonkészítmény véletlen öninjekciózását el kell kerülni, mert az emberi szervezetre ugyanolyan hatást gyakorol. Az állatgyógyászati készítményt várandós nők nem alkalmazhatják.

Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás

A vemhesség alatt nem alkalmazható.

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók: nem ismeretes.

Túladagolás: nem ismeretes.

Inkompatibilitások: Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

13.A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14.HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2013. október 24.

15.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1*10ml,6*10ml, 1*20ml, 6*20ml, 1,50ml, és 6*50ml injekciós üvegben, papírdobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

Rendelhetőség:

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.