

# Sensiblex<sup>®</sup>

Sensiblex injekció A.U.V



- Üszők ellésének megkönnyítése; a borjú tartási és helyeződési rendellenessége, fejlődési rendellenessége; a lágy szülőút elégtelen megnyílása vagy elégtelen tágulása esetén
- Olyan ellési zavarok esetén (pl. elhúzódó ellés), amikor spazimolitikummal történő kezelés eredményes lehet.



# Sensiblex injekció A.U.V



1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Veyx Pharma GmbH , Söhreweg 6, D-34639 Swarzenborn, Németország

A gyártási tételek végfelszabadásáért felelős gyártó:

Veyx-Pharma B.V Frellenweg 16, 4940 Raamsdonksveer, Hollandia

2.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Sensiblex injekció A.U.V

3.HATÓANYAGOK ÉSEGYPÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1ml készítmény tartalmaz:

Hatóanyag:

denaverin-hidroklorid 40mg (megfelel 36,5 mg denaverinnek)

Segédanyagok:

benzil-alkohol 20mg

4.JAVALLATOK

Szarvasmarha:

Üszök ellésének megkönnyítése; a borjú tartási és helyeződési rendellenessége, fejlődési rendellenessége; a lágyszülőút elégtelen megnyílása vagy elégtelen tágulása esetén. Méhcsavarodás követő repositio után első és másodfokú cervixszűkületnél. Fötómia esetén a feltételek javítása é a sérülés veszély csökkentése (relatív túlnagy magzat, tartási, helyeződési rendellenességek, holt magzatnál, fejlődési

rendellenességek esetén). Fötómia esetén epidurális érzéstelenítés szüksége. A fájástevékenység szabályozása és a myometrium hypertóniája esetén. Alkalmazható az ellés megkönnyítésére a megnyílási szak végén vagy tágulási szakba.

Kutya:

Olyan ellési zavarok esetén (pl. elhúzódó ellés), amikor spazimolitikummal történő kezelés eredményes lehet.

#### 5. ELLENJAVALLATOK

Az ellés előkészítő szakában vagy a korai megnyílási szakban ( a cervix zárt vagy enyhén nyitott állapotában) nem alkalmazható.

#### 6. MELLÉKHATÁSOK

Alkalmazás után s beadás helyén rövid idegi tartó duzzanat előfordulhat.

Ha súlyos, nem kívánt hatást vagy egyéb, az alkalmazási utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

#### 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha és kutya

#### 8. ADAGOLÁS, ALKALAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT ÉS A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Szubkután vagy intramuszkulárisan alkalmazható. A beadást követően 5-10 perccel fejt ki hatását, amely további 10 percen át tart.

Tehén: 10ml (400mg/állat)

Üsző: 5,0-10,0ml (200-400 mg/állat)

Kutya: 0,5-1,5 ml

A Sensiblex injekció adása szükséges esetén szarvasmarhánál 40-60 perc múlva hasonló adaggal megismételhető.

#### 9. ÉLELMEZÉS EGÉSZSÉGÜGY VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha ehető szövetek, tej: nulla nap

#### 10. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25C-on tárolandó.

Közvetlen napfénytől védve tartandó.

Csak a címkén feltüntetett lejáratidőn belül szabad felhasználni!

A tartály első felbontása után felhasználható: 28 napig.

#### 11. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

A készítmény benzil-alkoholt tartalmaz, ezért macskánál nem szabad alkalmazni.

Munkavédelmi óvórendszabályok:

Véletlen öninjekciós esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a

készítmény használati utasítását vagy címkéje.

12.A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉÉ VONATKOZÓ SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

13.HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2011.március 9.

14.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség:

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság:

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Kiszerezési egység:

10ml, 50ml s 6x10ml, gumidugóval és alumínium kupakkal lezárt színtelen injekciós üvegben, dobozban.